

療血得注射液 10%w/v

Rheomacrodex® in Glucose Injection 10%w/v

衛署藥製字第 047902 號

[描述]：Rheomacrodex 10%w/v 是以注射用水將 5%w/v 的葡萄糖與 10%w/v 葡聚糖 40 溶解後所製成的藥劑。本劑因具有以低分子葡聚糖解離血管內紅血球之凝集(sludging)，有使血液黏度低下防止末稍循環不全的特性。當作血漿增量劑時，可改善末稍循環，具有預防及治療血栓症，體外循環灌流亦適用。

[適應症]：外傷、內出血、手術時之急性失血。

[使用禁忌]：低張性脫水症患者及瘀血性心不全患者應避免使用。

[用法及用量]：本藥限由醫師使用。通常成人每次靜脈注射量為 500mL，最初 24 小時內給藥量約為 20mL/kg 以下。預防及治療血栓症連續使用時，一日 10mL/kg 以下，連續使用不得超過五日。進行體外循環灌流時則注射 10~20mL/kg，但注入量必須在 20mL/kg 以下。同時，給藥量及注射速度，可依患者年齡、體質及症狀作適當的增減。

[注意事項]：與 Kanamycin、Gentamycin 等的氨基糖系抗生物質併用時，可能引發腎毒性增強，若認為有乏尿等腎異常現象出現時，即中止注射並進行持續的血液過濾透析法、血漿交換、血液透析等適當處理。

若為下列患者應謹慎使用：腎臟病、尿崩症、肺水腫、糖尿病、有低纖維蛋白原血症及血小板減少症等出血傾向者、脫水狀態者、鉀缺乏傾向者、慢性肝病患者。

[包裝]：500mL x 30 瓶

[貯存]：室溫 (15°C~30°C) 保存，儘可能保存在溫度變化少的場所。

[健保代碼]：A047902277

委託製造廠：台灣大塚製藥股份有限公司 中壢工廠

藥 商： **TGCC 台灣綠十字股份有限公司**
GREEN CROSS Taiwan Green Cross Co., Ltd.