

“綠十字” 血栓溶素注射劑 60,000 國際單位

Urokinase – Green Cross Inj. 60,000 IU

衛署藥製字第 048722 號

[描述]：血栓溶素 (Urokinase) 是一種 Plasminogen 之活化劑，以非常少量存於人尿中。血栓溶素 (Urokinase) 製劑是一種血栓溶解劑，它是由人尿中還未變壞時分離之且精製之，幾乎不含抗原性及毒性，且被廣泛地應用。當血栓及栓塞之治療劑，效用是被肯定的。

本品是一種無菌，乾燥結晶性製劑之血栓溶素，由新鮮人尿分離且精製而成，每瓶含有 60,000 IU 之血栓溶素及 40mg 人血清白蛋白作為賦形劑。

[適應症]：急性冠狀動脈栓塞、清潔靜脈導管、急性肺栓塞。末梢動脈、靜脈栓塞症。

[使用禁忌]：有出血處理困難的病人 (會出現顱內出血、咳血、腹膜後出血和其他)，接受顱內或脊髓手術或有顱內、脊髓受傷的病人 (二個月內)，動脈瘤病人，嚴重知覺障礙的病人為禁忌使用。

[用法及用量]：一般使用 10ml 生理食鹽液或葡萄糖液溶解該瓶中內含物後，作靜脈注射；亦可稀釋於適量的生理食鹽液或葡萄糖液溶解作靜脈點滴注射。

血栓阻塞性疾病 末梢動脈、靜脈栓塞症：第一天用 60,000-240,000 IU 後，漸漸減少劑量，連續使用約 7 天左右。

[注意事項]：曾有報告指出投與本劑的病人可能發生嚴重的出血性腦梗塞，病人要完全確認經腦血栓診斷，以避免本劑使用於一些易於發生出血性腦梗塞的腦梗塞病人的血栓治療。

下列情形需小心投與。出血性病人：接受外科手術處理 (包括肝、腎的活組織檢查法)，諸如糖尿病出血性視網膜病的出血性眼病，消化道出血、尿道出血、流產、成熟前分娩、剛剛生產後、月經期間等。可能出血的病人：消化道潰瘍，消化道憩室炎，結腸炎，嚴重高血壓，活動性肺結核，有顱內出血病史等。曾投與過抗凝血劑的病人。有嚴重肝、腎障礙病人。有難治低血液凝固能力的病人，凝血因子缺乏，血小板減少症。年長的病人。對本劑或組織培養之血栓溶素有過敏病歷之病人。

本劑與下列諸藥並用會增強出血傾向。抗凝固劑 (Warfarin 等) 有抗血小板凝集作用的藥劑 (Aspirin，dipyridamole，ticlopidine hydrochloride 等)。

[包裝]：60,000 IU × 10 vial

[貯存]：於室溫中貯藏。

[健保代碼]：A048722251

委託製造廠：中國化學製藥股份有限公司 新豐工廠

藥 商： 台灣綠十字股份有限公司
Taiwan Green Cross Co., Ltd.