

"韓國綠十字"血栓溶素注射劑 6,000 國際單位

Urokinase-GCC Injection 6,000 I.U.
(Fibrinolytic agent)

許可證字號：衛署藥輸字第 018771 號

[描述]：Urokinase 為具有高度纖維蛋白溶酶原的活化劑，係由人尿中分離，以無菌方式製得之高純度酵素，分子量為 54,000 daltons。易溶於 5%葡萄糖及生理食鹽水中。每小瓶含主成份 purified urokinase 6,000 I.U.。

[適應症]：急性肺栓塞，急性冠狀動脈栓塞，清潔靜脈導管

[使用禁忌]：鑑於血栓溶解治療會增加出血的危險，因而在下列情形不要使用本劑：易於內出血者；近期(在兩星期內)有腦血管意外，進行顱內或椎管內手術者；嚴重肝疾病或是纖維蛋白不足者。

[用法及用量]：本藥限由醫師使用。Urokinase 必須在能進行所需要之臨床及實驗室監測下的醫院中進行。

心肌梗塞 最初劑量：在半小時內注射 26,000 – 52,000 I.U.。在投於初劑量後，應該持續使用七天。總劑量：300,000 I.U.或更多。

肺栓塞 最初劑量：在 10 分鐘內使用 250,000 I.U.。在投予初劑量後，應持續使用四天。總劑量依體重而定。

[注意事項]：藥物可能會改變血小板的功能，例如使用 Urokinase 治療時，應避免使用 aspirin、indomethacin 及 phenylbutazone。

曾使用 heparin 之患者，在進行 Urokinase 治療前，需監測凝血酶之時間。若產生嚴重出血，應立即停止輸注 Urokinase 注射液。

[包裝]：6,000 I.U. 小瓶裝，100 小瓶以下盒裝。

[貯存]：室溫 (25°C以下儲存)

[健保代碼]：B018771223

製造廠: GREEN CROSS CORPORATION

藥 商: 巨人股份有限公司